

Revista Colombiana de
Cardiología

Enfrentando Retos

Dr. Darío Echeverri. M.D., F.A.C.C.

EDITOR


Medellín – Colombia

2017

órgano oficial de la




**SOCIEDAD
COLOMBIANA
DE CARDIOLOGÍA Y
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR**




23 Volúmenes
158 Números
1650 Artículos







Fuente: Revista Colombiana de Cardiología. Estadística 2017. Bogotá- Colombia



Fuente: Revista Colombiana de Cardiología. Estadística 2016. Bogotá- Colombia




Fuente: Elsevier System



Fuente: Analytics web RCC

Octubre – Diciembre 2016



Fuente: Elsevier Analytics





Auditoría externa por Bureau Veritas

La Revista fue auditada con éxito en noviembre de 2016 y la acreditación fue renovada.

2016 - 2017

Pub**l**Med

Medline



Producción editorial de suplementos, guías, consensos y estados del arte:

- Suplemento Clínicas de Falla Cardíaca 2016
- Guías de utilización del mapeo tridimensional 2016
- Suplemento de Hipercolesterolemia Familiar 2016
- Guías de tratamiento de Fibrilación Auricular 2017




En Camino:

- Estado del arte de Hipertensión Pulmonar y Cateterismo Derecho
- Cardiología de la Mujer
- Suplemento de Imágenes en Cardiología



FACEBOOK


6220 Likes



TWITTER

702 Seguidores

Página de acceso a usuarios



Página de acceso a usuarios



Página de acceso a usuarios



**Relación entre
Enfermedad
Trombotica y
Síndrome Coronario
Agudo**



EFICACIA en el
Tratamiento Síndrome
Coronario Agudo



SEGURIDAD en el
Tratamiento Síndrome
Coronario Agudo



**APLICACIÓN
TERAPEUTICA** en el
Tratamiento Síndrome
Coronario Agudo



Endop

Endopró

Terapia
Aorta



**No todos los
anticoagulantes
inyectables
son iguales**

arixtra
fondaparinux

**La opción moderna por eficacia,
seguridad y facilidad de utilización**



ARIXTRA® 2.5 mg/0.5 ml, ARIXTRA® 7.5 mg/0.6 ml. Forma farmacéutica: Solución inyectable. Composición: ARIXTRA® 2.5 mg/0.5 ml. Cada jeringa prellenada contiene 2.5 mg de Fondaparinux sódico, excipientes c.s. ARIXTRA® 7.5 mg/0.6 ml. Cada jeringa prellenada contiene 7.5 mg de Fondaparinux, excipientes c.s. Vía de administración: Subcutánea. Indicaciones: Prevención de eventos tromboembólicos venozos (ETV) en pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor de las extremidades inferiores, tanto: fractura de cadera, cirugía profiláctica extendida; cirugía de reemplazo de rodilla; cirugía reemplazo de cadera. Prevención de eventos tromboembólicos venozos (ETV) en pacientes sometidos a cirugía abdominal y que tienen riesgo de complicaciones tromboembólicas. Prevención de eventos tromboembólicos venozos (ETV) en pacientes con riesgo de complicaciones tromboembólicas debido a restricción de la movilidad durante una enfermedad aguda. Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) aguda. Tratamiento de embolia pulmonar (EP) aguda. Tratamiento de síndrome coronario agudo acompañado de angina de pecho inestable, o por infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (MI NSTEMI), para prevenir la muerte, un infarto de miocardio o el desarrollo de isquemia miocárdica. Se ha demostrado que Arixtra reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas en pacientes que padecen MI NSTEMI. Tratamiento de síndrome coronario agudo acompañado por infarto de miocardio con elevación del segmento ST (MIEST), para prevenir la muerte y un síndrome de resaca en aquellos pacientes que se encuentran en tratamiento con agentes trombolíticos, o que no voyen a recibir inicialmente alguna otra forma de terapia de revascularización. Se ha demostrado que Arixtra reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas en pacientes que padecen MIEST. Contraindicaciones: Pacientes con hemorragia activa actual, hiperemfilia conocida o Fondaparinux. No es para administración intramuscular. Debe ser usado con precaución en pacientes que tienen un tiempo aumentado de hemorragia. Los hematomas espontáneos o espontáneos, que pueden ocasionar una puntada permanente o prolongada, no pueden ser evitados con el uso concomitante del producto en pacientes aquejados o parálisis. Debe ser usado con precaución en pacientes con insuficiencia renal moderada o severa, sin descomponer la seguridad del producto en pacientes con insuficiencia renal moderada y en periodo de lactancia. Presentación comercial: Caja con 3 jeringas prellenadas. Condición de venta: Venta bajo fórmula médica. Condición de almacenamiento: Almacenar a temperatura no mayor a 30°C. Registro Sanitario: ARIXTRA® 2.5 mg/0.5 ml. Reg. San. No. INVIMA 2012M-0010359-R1. ARIXTRA® 7.5 mg/0.6 ml. Reg. San. No. INVIMA 2008M-0006595.





Amenazas del Entorno

- ❖ Crisis económica mundial.
- ❖ Control de precios medicamentos y dispositivos.
- ❖ Proliferación de eventos científicos.
- ❖ Competitividad con Revistas fuertes o en crecimiento.
- ❖ Oferta de Revistas Internacionales.
- ❖ Pago en dinero a autores.

Research Intelligence

A comprehensive research information management portfolio

Improve your ability to establish, execute,
and evaluate institutional research strategy.

WHAT WE SUPPORT

Our solution supports the three primary pillars of strategic research management workflow by providing reliable data and information to facilitate better decision making.

Enable Research

- Develop Strategy
- Identify & Recruit Researchers
- Secure Funding
- Establish Partnership
- Manage Facilities

Conduct Research

- Search, Discover, Read, Review
- Collaborate, Network
- Experiment
- Analyze, Synthesize

Share Research

- Manage Data
- Publish and Disseminate
- Commercialize
- Promote

- ❖ Bajo Factor de Impacto.
- ❖ Endogamia alta.
- ❖ Pobre Visibilidad Internacional.



ESTRATEGIA



Ejecucion

+ Decisiones
+ Acciones







- ❖ Documentación para indexación.
- ❖ Fortalecimiento de la página web.
- ❖ Programas de capacitación.
- ❖ Suplementos de actualización y Estados del Arte.
- ❖ Productos digitales para la industria (Micrositios).
- ❖ Vinculación de fellows a la RCC.
- ❖ Alianzas Instituciones Científicas Internacionales.
- ❖ Uso de otros indicadores.



- ❖ Mejorar la calidad del artículo:
Título, resumen, palabras clave, metodología, sponsors, “grants”, afiliaciones, referencias recientes, etc.
- ❖ Capacitación a árbitros – revisores.
- ❖ Vinculación de árbitros internacionales.
- ❖ Artículos en inglés.



- ❖ Mayor colaboración internacional.
- ❖ Autores locales—publiquen en otras revistas y referencien la RCC.
- ❖ Autores internacionales – publiquen en la RCC.



- ❖ Publicaciones en inglés – Traducción.
- ❖ Alianzas con autores o instituciones internacionales
Con alta visibilidad.
- ❖ Identificar quien nos cita? - Retroalimentación.

Muchas Gracias